

Laudis

Szelektív posztemergens kukorica gyomirtó szer

Hatóanyaga:

gyomirtó hatóanyag: 44 g/l tembotrion
széfener hatóanyag: 22 g/l izoxadifen-etil

Forgalmazási kategória: II.

Kiszerezés: 5 l

Dózis: 1,75 - 2,25 l/ha

Erő és harmónia

Szelektivitás

A kukorica képes lebontani a Laudis hatóanyagát a tembotriont. A széfener javítja a termék szelektivitását egyes érzékenyebb kukorica hibridek, csemegekukorica fajták esetében. Ezt a hatást úgy éri el, hogy fokozza a hatóanyag metabolizmusát a kukoricában, de nem befolyásolja annak a sebességét a gyomnövényekben.

Hatásspektrum

A készítmény elsősorban a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen alkalmazható.

Érzékeny gyomnövények:

- egyszikűek: aszályfű, cérnaköles, egyéves cirok-félék, fakó muhar, magról kelő fenyércirok, közönséges kakaslábű, pirók ujjasmuhar, ragadós muhar, vadköles, zöld muhar
- kétszikűek: árvacsalán, árvakelésű napraforgó, ballagófű, baracklevelű keserűfű, bortorján szerbtövis, csattanó maszlag, egynyári szélű, fehér disznóparéj, fehér libatop, fekete csucsor, füge levelű libatop, henye disznóparéj, karcsú disznóparéj, lapulevelű keserűfű, mezei acat, mezei csorbóka, mezei tarsóka, olasz szerbtövis, parlagfű, pásztortáska, pokolvar libatop, porcsin keserűfű, repcsény retek, selyemmályva, sokmagvú libatop, szőrös disznóparéj, szúrós szerbtövis, tarló tisztesfű, terebélyes laboda, tyúkhúr, vadkender, vadrepce, varjúmák, zöld disznóparéj

Hatását főként levélen és hajtáson keresztül felszívódva fejti ki, de megfelelően csapadékos években 4-5 hetes talajon keresztüli tartamhatást tapasztaltunk parlagfű, libatop-félék, disznóparéj-félék, köles fajok valamint selyem mályva ellen.

Felhasználható:

Kukorica posztemergens gyomirtására magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen

Adagolás:

1,75 - 2,25 l/ha

A kijuttatáshoz javasolt víz mennyisége 200-400 l/ha.

Javasolt technológia:

A készítményt posztemergensen kell kijuttatni. A kezelés optimális időpontja a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles fenológiai stádiuma (gyökérváltás). A hazai vizsgálatok azt mutatják, hogy a készítmény a magasabb dózisban (2,25 l/ha) normális növekedési feltételek mellett még fejlettebb gyomnövények ellen is eredményesen alkalmazható.

Az utolsó kezelés időpontja a kukorica 7-8 leveles állapota.

Kukoricavonalak, csemegekukorica gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni! Kukoricavonalakban, csemege kukoricában kombinációban csak azokban engedélyezett készítményekkel juttatható ki.

[Csemegekukorica fajták, melyekre a Laudis szelektívnek bizonyult az eddigi hazai vizsgálatokban.](#)

Vetésváltás

- normál vetésváltás esetében a kezelés évében ősszel vethető: őszi árpa, búza, tritikálé, valamint repce. A következő év tavaszán korlátozás nélkül vethető: cukorrépa, napraforgó, paradicsom, burgonya, tavaszi repce, borsó.

- ha valamilyen oknál fogva a kezelt kukorica megsemmisül, vagy el kell távolítani a területről, egy hét elteltével kukorica, két héttel a kezelést követően cirok vethető.

Várakozási idők:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs korlátozás

Eltarthatóság:

Eredeti csomagolásban, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

AKG programokban alkalmazható.

Kérjük, használat előtt feltétlenül olvassa el a termék címkéjét is!