



Felhasználási javaslat



Ő. búza gombaölőszeres technológia

Egy kezelés

kalászhányás –
virágzás eleje

Amistar Xtra 0,8-1,0 l/ha

vagy

Artea 0,5 l/ha

vagy

Cherokee 1,5-2,0 l/ha

Két kezelés

1. kezelés:
1-3 nódusz-
kalászhányás

Amistar Xtra


0,8 l/ha

vagy

Artea 0,4-0,5 l/ha

Cherokee
1,5-2,0 l/ha

2. kezelés:
virágzás eleje



Lintur[®]

Tartamhatás és széles kétszikű spektrum



Felhasználás ideje:

- őszi kalászosokban 3 leveles-szárba indulásig
- tavaszi árpában 2-5 leveles állapotban
- sörárpában engedélyezett, fehérjetartalmat nem befolyásolja

Javasolt dózis:

- őszi-, tavaszi kalászosokban 120-150 g/ha
 - alacsonyabb dózis:
 - kamilla-, pipitérfélék, repce, tyúkhúr, pásztortáska, libatop
 - gyomok 2-4 leveles nagyságáig
 - jó gyomelnyomó kultúrnövény
 - magasabb dózis:
 - évelő gyomok, galaj, pipacs
 - 4 levelesnél fejlettebb gyomok
 - ritka állomány

syngenta[®]